

## Lijst met aandoeningen voor fysiotherapie en/of oefentherapie

---

### Lijst met aandoeningen voor fysiotherapie en/of oefentherapie

Ingangsdatum 1 januari 2018

#### Algemeen

- Op deze lijst staan de aandoeningen die op grond van artikel B.8. van de verzekeringsvoorwaarden recht kunnen geven op fysiotherapie en/of oefentherapie.
- Deze lijst is gelijk aan bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering.
- U hoeft geen akkoordverklaring aan ons te vragen als u naar een fysiotherapeut of oefentherapeut gaat waarmee wij een zorgovereenkomst hebben gesloten. U kunt die zorgverleners vinden op onze internetsite. De therapeut beoordeelt namens ons of uw aandoening voorkomt op de "Lijst met aandoeningen voor fysiotherapie en/of oefentherapie".
- Bij een aantal aandoeningen is sprake van een maximale behandelduur; die staat in de lijst hieronder genoemd.

#### Een van de volgende aandoeningen van het zenuwstelsel

cerebrovasculair accident (CVA)	
ruggemergaandoening	
multipele sclerose	
perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval	
extrapyramidale aandoening	
motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar	
aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel	
cerebellaire aandoening	
uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel	
radiculair syndroom met motorische uitval	duur van behandeling is maximaal drie maanden
spierziekte	
myasthenia gravis	

#### Een van de volgende aandoeningen van het bewegingsapparaat

aangeboren afwijking	
progressieve scoliose	
juvenile osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar	
reflexdystrofie	
fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget	
frozen shoulder (capsulitis adhaesiva)	de duur van behandeling is maximaal twaalf maanden
hyperostotische spondylose (morbus Forestier)	
collageenziekten	
status na amputatie	
whiplash	de duur van de behandeling is maximaal drie maanden. Indien hierna nog sprake is van de trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, kan deze periode verlengd worden met maximaal zes maanden.

## Lijst met aandoeningen voor fysiotherapie en/of oefentherapie

---

postpartum bekkeninstabiliteit	duur van behandeling is maximaal drie maanden
fracturen indien deze conservatief worden behandeld.	duur van behandeling is maximaal zes maanden na conservatieve behandeling

### Een van de volgende overige aandoeningen

Chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD	
aangeboren afwijking van de tractus respiratorius	
lymfoedeem	
littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma	
status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling	duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden in aansluiting op ontslag naar huis of beëindiging van de behandeling in de instelling
perifeer arterieel vaatlijden in stadium 3 Fontaine	de duur van behandeling is maximaal twaalf maanden
weke delen tumoren	duur van behandeling is maximaal twee jaren na bestraling
diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis	